

227 Gaviota reidora

Gaviota reidora. Primavera. 3º año (29-III).

GAVIOTA REIDORA (*Larus ridibundus*)**IDENTIFICACIÓN**

34-43 cm. **Adultos** en plumaje **nupcial**, cabeza marrón, partes inferiores, base del cuello y cola blancos, dorso y alas grises, éstas con la punta blanca; pico y patas rojos. En plumaje **invernal** sin marrón en la cabeza, sólo con algunas manchas junto al ojo; patas amarillo anaranjado. **Juveniles** rayados de ocre, con pico y patas amarillentos.

ESPECIES SIMILARES

Es la única especie de gaviota nidificante en Aragón con cabeza de color marrón y patas y pico rojos. En plumaje de invierno inconfundible por el extremo del ala de color blanco terminado en punta negra.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:

Juveniles con cabeza, dorso y borde de coberteras del ala teñidas de ante; cola con banda subterminal oscura; patas y pico de color ante-rosado.

1º año otoño/2º año primavera se reconocen por la cola con banda subterminal negra; escapulares, terciarias y coberteras medianas con borde pardo; secundarias, coberteras primarias externas y álula con marcas oscuras.

2º año otoño/3º año primavera sólo en algunos ejemplares que tienen la pluma mayor del álula con una mancha marrón; generalmente, pero no siempre, con el raquis de alguna pluma del álula y alguna cobertera primaria externa con una línea negra; generalmente pico y patas anaranjados.

Adultos con pico y patas rojos; plumas del álula y coberteras primarias blancas; plumas de la cola blancas; escapulares, terciarias y coberteras medianas grises; secundarias y primarias internas grises.

SEXO

Ambos **sexos** son similares en cuanto al plumaje, si bien los **machos** son en promedio de mayor tamaño que las **hembras**: **machos** con longitud de cabeza y pico mayor de 83 mm, ala mayor de 315 mm; **hembras** con longitud de cabeza y pico menor de 81 mm. (medidas tomadas en ejemplares del norte de Europa y en adultos). **CUIDADO**: alas menores de 315 mm pueden ser indistintamente de machos y hembras.

MUDA


Muda **postnupcial** completa, entre mayo y octubre; el color marrón de la cabeza perdido entre agosto-septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial cambiando, hasta diciembre, las plumas corporales y algunas coberteras del ala. En su primera muda **postnupcial** pueden cambiar todo el plumaje o, en algunos ejemplares, conservar algunos rasgos juveniles en las plumas del ala. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** en primavera que abarca las plumas de la cabeza y el cuerpo adquiriendo el plumaje nupcial.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII


ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, siendo más abundante en época invernal. Como nidificante está circunscrita al Aragón central, pudiendo aparecer en invierno en cualquier pantano o zona húmeda de la Comunidad.




Gaviota reidora. Primavera. Adulto ().

227 Gaviota reidora




Gaviota reidora. Primavera. 2º año ().




Gaviota reidora. Primavera. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba 2º año (); abajo juvenil (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Diseño del pecho: izquierda adulto (); derecha 3º año (29-III).





Gaviota reidora. Primavera. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba adulto (); abajo 3º año (29-III).



Gaviota reidora. Primavera. Diseño del pecho: izquierda 2º año (); derecha juvenil (09-VII).

227 Gaviota reidora




Gaviota reidora. Primavera. Diseño de las patas: arriba 2º año (); abajo juvenil (09-VII).

Gaviota reidora. Primavera. Diseño del dorso: izquierda adulto (); derecha 3º año (29-III).



Gaviota reidora. Primavera. Diseño del dorso: izquierda 2º año (); derecha juvenil (09-VII).

Gaviota reidora. Primavera. Diseño de la cola: izquierda adulto (); derecha 3º año (29-III).




Gaviota reidora. Primavera. Diseño de las patas: arriba adulto (29-VII); abajo 3º año (29-III).




Gaviota reidora. Primavera. Diseño de la cola: izquierda 2º año (); derecha juvenil (09-VII).

227 Gaviota reidora



Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño del álula ().




Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño de coberteras primarias (29-III).




Gaviota reidora. Primavera. 3º año: diseño del álula (29-III).



Gaviota reidora. Primavera. 3º año: coberteras primarias con diseño de adulto ().



Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño del álula ().



Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño de coberteras primarias ().




Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño del álula (09-VII).

227 Gaviota reidora



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño de coberteras primarias (09-VII).




Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño de primarias ().



Gaviota reidora. Primavera. Diseño de terciarias: izquierda adulto (); derecha 3º año (29-III).




Gaviota reidora. Primavera. 3º año: diseño de primarias (29-III).



Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño de primarias ().




Gaviota reidora. Primavera. Diseño de terciarias: izquierda 2º año (); derecha juvenil (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño de primarias (09-VII).

227 Gaviota reidora




Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño de secundarias ().



Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño del ala ().



Gaviota reidora. Primavera. 3º año: diseño de secundarias (29-III).



Gaviota reidora. Primavera. 3º año: ala con diseño de adulto (29-III).

Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño de secundarias ().



Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño del ala ().

Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño de secundarias (09-VII).


227 Gaviota reidora



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño del ala (09-VII).




Gaviota reidora. Otoño. Adulto (11-XI).



Gaviota reidora. Otoño. 2º año (11-XI).



Gaviota reidora. Otoño. 1º año (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba adulto (11-XI); centro 2º año (); abajo 1º año (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (11-XI); arriba derecha 2º año (); izquierda 1º año (28-XII).


227 Gaviota reidora



Gaviota reidora. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (11-XI); arriba derecha 2º año (); izquierda 1º año (28-XII).




Gaviota reidora. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (11-XI); arriba derecha 2º año (); izquierda 1º año (28-XII).




Gaviota reidora. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto (11-XI); centro 2º año (); abajo 1º año (28-XII).




Gaviota reidora. Otoño. Adulto: diseño del álula (12-X).



227 Gaviota reidora




Gaviota reidora. Otoño. 2º año: diseño del álula ().




Gaviota reidora. Otoño. 2º año: diseño de coberteras primarias ().



Gaviota reidora. Otoño. 1º año: diseño del álula (28-XII).




Gaviota reidora. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Adulto: diseño de coberteras primarias (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. Adulto: diseño de primarias (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. 2º año: diseño de primarias ().

227 Gaviota reidora




Gaviota reidora. Otoño. 1º año: diseño de primarias (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. Adulto: diseño de secundarias (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. 2º año: diseño de secundarias ().



Gaviota reidora. Otoño. Diseño de terciarias: arriba izquierda adulto (11-XI); arriba derecha 2º año (); izquierda 1º año (28-XII).

227 Gaviota reidora



Gaviota reidora. Otoño. Adulto: diseño del ala (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. 2º año: diseño del ala ().



Gaviota reidora. Otoño. 1º año: diseño del ala (28-XII).